

Aus der chirurgischen Abteilung der Universitätsklinik Basel
(Vorsteher: Professor Dr. C. Henschen)

UEBER DAS SPÄTBLUTBILD NACH
AUSGEDEHNTEN MAGENRESEKTIONEN
WEGEN ULCUS VENTRICULI
UND ULCUS DUODENI

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE
DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT
DER UNIVERSITÄT BASEL

VORGELEGT VON
ALOIS BOSSARD
VON LUZERN

Separat-Abdruck aus der Deutschen Zeitschrift für Chirurgie
Verlag Julius Springer, Berlin — 1934

Aus der chirurgischen Abteilung der Universitätsklinik Basel
(Vorsteher: Professor Dr. C. Henschen)

UEBER DAS SPÄTBLUTBILD NACH
AUSGEDEHNTEN MAGENRESEKTIONEN
WEGEN ULCUS VENTRICULI
UND ULCUS DUODENI

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE
DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT
DER UNIVERSITÄT BASEL

VORGELEGT VON
ALOIS BOSSARD
VON LUZERN

Separat-Abdruck aus der Deutschen Zeitschrift für Chirurgie
Verlag Julius Springer, Berlin — 1934

Von der medizinischen Fakultät der Universität Basel genehmigt auf Antrag von Professor Dr. C. Henschen. Tag der Promotion: 4. März 1931.
Erschienen: Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, 243. Band, S. 118.



Meiner Mutter
und dem Andenken meines Vaters
gewidmet

Schon frühzeitig, nachdem *Péan* 1879 die erste tödlich endende Pylorusresektion und *Billroth* 1881 die erste erfolgreiche zirkuläre Pylorusresektion ausgeführt hatte, wurden die Spätresultate der Magenresektion nachgeprüft, wobei besonders die Motilität geprüft und bei Ulcus oder Carcinom auf Rezidivfreiheit kontrolliert wurde: *Ewald*, *Zeller*, *Haberkant*, *v. Mikulicz*, *Matti*, *Kocher* u. v. a.

Genaue den modernen Ansprüchen genügende Analysen der Motilität des resezierten Magens stammen erst aus der letzten Zeit: *Göcke*, *Schüller*, *Faulhaber* und *v. Redwitz*, *Friedemann*, *Kirschner*, *v. Haberer* u. a.

Den Chemismus des Magens nach Resektion untersuchten speziell *Pawlow*, *Schmidt*, *London*, *Sidney A. Portis* und *Bernard Portis*, *M. Faulhaber* und *v. Redwitz*. Das Resultat der Arbeiten von *Pawlow*, *London*, *Schmidt* u. a. wird im Werk von *Babkin* eingehend erörtert.

An einem ausgedehnten Material, nämlich an 107, teils nach *Billroth I*, teils nach *Billroth II* operierten Ulcuskranken, wurden von *Gustav Stern* Kontrolluntersuchungen durchgeführt; wenn diese vor allem den Magenchemismus betrafen, wurde daneben auch das Blutbild berücksichtigt: *Stern* konnte eine Beeinflussung des Blutbildes durch die Resektion nicht feststellen.

Dagegen finden sich in der Literatur verschiedene Angaben über das Vorkommen von Resektionsanämien. Einige Jahre nach der Operation traten pernicioso-ähnliche oder echte perniziöse Anämien auf: *Hartmann* (1921), *Hochrein*, 2 Fälle (1929), *H. Denning* (1929), *Scheidel* (1930).

Andere Resultate veröffentlichten *G. Gordon*, *V. Hudson*, *E. C. Dodds*, *J. L. Warner*, *L. E. H. Whitby*, die bei 52 Magenresezierten Nachuntersuchungen anstellten: Bei allen Operierten zeigte sich keine ernstliche Störung ihrer Ernährung und ihres Stoffwechsels. 38 männliche hatten Hgb. 70–80%, rote Blutkörperchen 4,4–5 Mill.; 14 weibliche hatten Hgb. 65–75%, rote Blutkörperchen 3,7–4,4 Mill. Bei 44% der Operierten fand sich eine Daueranämie; jedoch bei keinem konnte perniziöse Anämie gefunden werden. Im Blut fand sich eine Steigerung des Cholesterins und des Harnsäurespiegels. 20% hatten freie HCl, 50% Fibrin in den Faeces. Allgemein bestand eine Neigung zur Zunahme des Fettgehaltes der Faeces und zu einer Anreicherung der Darmflora, ohne daß sich dabei besondere Bakterientypen in auffälliger Weise daran beteiligten.

Anschließend verweise ich auf die zusammenfassende Arbeit von *C. Henschen*. Darin sind noch 12 weitere Beobachtungen aus der Literatur angeführt, bei welchen nach Resektion oder G. E. alle Kardinalsymptome der echten Perniciosa aufgetreten seien. In dieser Arbeit wird besonders auch eingegangen auf die Versuchs- und Anlösmöglichkeiten der Resektionsanämien; es werden u. a. die Beziehungen des Dünndarmes und seiner zugewandten Organe zur perniziösen

Anämie erwähnt mit der entsprechenden Literatur: *Meulengracht, v. Molov, Cl. F. Dixon, Seyderhelm, Zadeck, Faber und Nyfeldt, R. Ehrström u. a.*

Auf Veranlassung von H. Prof. C. *Henschen* habe ich Nachuntersuchungen bei Patienten, die vor Jahren eine Magenoperation durchmachten, angestellt, wobei ich ganz besondere Aufmerksamkeit dem Blutbilde widmete.

Von den 159 brieflich Bestellten erschienen 77 persönlich; 23 gaben schriftlichen Bericht; 33 gaben keine Nachricht; 14 konnten nicht mehr aufgefunden werden; 12 sind gestorben.

Der Wert meiner Nachuntersuchungen liegt darin, daß für den größeren Teil der Fälle (56 Fälle) das Blutbild, das der Patient vor der Operation aufwies, bekannt ist. Frühere Arbeiten auf diesem Gebiete enthalten nur spärliche oder gar keine Angaben über die Blutformel vor der Operation.

Von den 77 Patienten (63 männliche, 14 weibliche) zeigen jetzt bei der Nachuntersuchung 62 ein normales großes und kleines Blutbild und normale Senkungsreaktion, wovon 8 Fälle vor der Operation eine sekundäre Anämie aufgewiesen hatten; 14 wiesen bei der Nachuntersuchung relative Lymphocytose auf.

Das Zeitintervall zwischen Operation und Nachuntersuchung beträgt bei 2 Kranken 11, bei 4 10, bei 3 9, bei 6 8, bei 7 7, bei 5 6, bei 4 5, bei 8 4, bei 5 3, bei 11 2 Jahre, bei 8 1 Jahr, bei 14 weniger als 1 Jahr, bis 2 Monate.

An einigen Beispielen mögen meine Untersuchungsbefunde erläutert werden, und zwar vorerst bei Patienten mit normalem Blutbilde vor und nach der Operation (Fall 20 und Fall 72), dann bei Patienten mit sekundärer Anämie vor der Operation und mit heute normalem Hämoglobinwert (Fall 19 und Fall 42) und schließlich bei drei, die heute eine relative Lymphocytose aufweisen (Fall 7, Fall 69 und Fall 68).

Bei 9 Fällen mit relativer Lymphocytose hatte die Differenzierung der weißen Blutkörperchen vor der Operation nicht stattgefunden; es bleibt also bei einigen die Möglichkeit einer relativen Lymphocytose schon vor der Operation (Fall 68) offen.

Fall 20: 42j. Mann. Typische Magenbeschwerden seit 8 J. Klin. Diagnose: *Ulcera duodeni*. Juni 22 Magenresektion nach *Billroth II* mit G.E. retrocolica post. Patholog.-anatom. Diagnose: *Ulcera duodeni simplicia*. Beim Austritt geh. Gewicht vor der Op. 54,7 kg.

Blutbild vor der Operation:

Hämoglobin	82 %
Rote Blutkörperchen . . .	5,328 Mill.
Weißer Blutkörperchen . .	8640
Färbeindex	0,77

Mehrkernige neutrophile Leukocyten	61,5 %
Lymphocyten	22 %
Große mononukleäre Zellen .	7 %
Übergangsformen	7,5 %
Eosinophile Zellen	1,5 %
Mastzellen	0,5 %

Blutbild nach der Op., Nov. 29:

Hämoglobin	88 %
Rote Blutkörperchen . .	4,584 Mill.
Weißer Blutkörperchen .	6800
Färbeindex	0,98

Mehrkernige neutrophile Leukocyten	60,3 %
Lymphocyten	31,7 %
Große mononukleäre Zellen .	6 %
Übergangsformen	0 %
Eosinophile Zellen	1,3 %
Mastzellen	0,7 %
Blutplättchen im ccm . . .	345648

Nov. 29: Gewicht: 59 kg. Blutdruck 110. Senkungsreaktion: 9, 21, 78 (Leukocytenzahl: 0,5 mm). Magenbeschwerden: Leichter Druck über dem Nabel; sonst keine Beschwerden. Operationsnarbe o. B.; kein Narbenbruch.

Fall 72: 36j. Mann. Typische Magenbeschwerden seit 2,5 J. Klin. Diagnose: Ulcus duodeni. Juli 29 Magenresektion nach *Finsterer*. Beim Austritt geh. Gewicht vor der Op. 58,6 kg.

Blutbild vor der Op.:

Hämoglobin	90 %
Rote Blutkörperchen . .	5,276 Mill.

Weißer Blutkörperchen .	5700
Färbeindex	0,88

Blutbild nach der Op., Dez. 29:

Hämoglobin	85 %
Rote Blutkörperchen . .	4,632 Mill.
Weißer Blutkörperchen .	6600
Färbeindex	0,91

Mehrkernige neutrophile Leukocyten	71,25 %
Lymphocyten	19,20 %
Große mononukleäre Zellen .	7,75 %
Übergangsformen	0 %
Eosinophile Zellen	0,77 %
Mastzellen	1,03 %

Dez. 29: Gewicht 58,9 kg. Blutdruck 115. Senkungsreaktion: 1, 4, 49 (Leukocytenzahl 2 mm). Keine Magenbeschwerden; zeitweise Krämpfe in den Därmen. Operationsnarbe o. B.; kein Narbenbruch.

Fall 19: 52j. Mann. Typische Magenbeschwerden seit 10 J. Klin. Diagnose: Ulcera duodeni. Hochgradige sekundäre Anämie. 27. IV. 22 Magenresektion nach *Billroth II* mit G. E. retrocolica ant. Patholog.-anatom. Diagnose: Ulcera pylori simplici. Beim Austritt geh. Gewicht vor der Op. 63,5 kg.

Blutbilder vor der Op.: 2. III. 22:

Hämoglobin	20 %
Rote Blutkörperchen . .	1,488 Mill.
Weißer Blutkörperchen .	5340
Färbeindex	0,71

Mehrkernige neutrophile Leukocyten	75,66 %
Lymphocyten	16,67 %
Große mononukleäre Zellen .	1,67 %
Übergangsformen	3,67 %
Eosinophile Zellen	0,67 %
Mastzellen	1,66 %
1 Normoblast, 5 Myelocyten, 4 Mastmyelocyten.	

15. IV. 22:

Hämoglobin	23 %
Rote Blutkörperchen . .	2,452 Mill.

Mehrkernige neutrophile Leukocyten	68 %
--	------

15. IV. 22:

Weißer Blutkörperchen . 6480
Färbeindex 0,48

Lymphocyten 21 %
Große mononukleäre Zellen . 1,7 %
Übergangsformen 9,3 %
Eosinophile Zellen —
Mastzellen —
2 Normoblasten. 1 freier Normo-
blastenkern. Aniso- und Poikilo-
cytose.

24. IV. 22:

Hämoglobin 28 %
Rote Blutkörperchen . . 2,904 Mill.

Weißer Blutkörperchen . 7720
Färbeindex 0,53

Blutbilder nach der Op.: 28. IV. 22:

Hämoglobin 28 %
Rote Blutkörperchen . . 3,012 Mill.

Weißer Blutkörperchen . 13200
Färbeindex 0,46

16. V. 22:

Hämoglobin 32 %
Rote Blutkörperchen . . 3,04 Mill.
Weißer Blutkörperchen . 7160
Färbeindex 0,54

Mehrkernige neutrophile Leu-
kocyten 65 %
Lymphocyten 15,7 %
Große mononukleäre Zellen . 1,7 %
Übergangsformen 8,6 %
Eosinophile Zellen 8 %
Mastzellen 1 %
1 Myelocyt. Poikilo- und Aniso-
cytose.

Im Dez. 29:

Hämoglobin 81 %
Rote Blutkörperchen . . 4,016 Mill.
Weißer Blutkörperchen . 5400
Färbeindex 1

Mehrkernige neutrophile Leu-
kocyten 80,4 %
Lymphocyten 11 %
Große mononukleäre Zellen . } 5,3 %
Übergangsformen }
Eosinophile Zellen 2,3 %
Mastzellen 1 %
Anisocytose

Dez. 29: Gewicht 68,5 kg. Blutdruck 125. Senkungsreaktion: 12, 29, 87 (Leukocyten-schicht: 1,5 mm). Keine Magenbeschwerden. Verträgt kein rohes Obst. Operationsnarbe o. B., kein Narbenbruch.

Fall 42: 65j. Mann. Typische Magenbeschwerden seit 24 J. Klin. Diagnose: Ulcus ventriculi pept. Haematemesis. April 26 Magenresektion nach Billroth. (1920 G.E. retrocolica post.) Patholog.-anatom. Diagnose: Keine Ulcera. Zwei echte flache Divertikel. Beim Austritt geh.

Gewicht vor der Op. 55,9 kg.

Blutbilder vor der Op.: 22. X. 25:

Hämoglobin 40 %
Rote Blutkörperchen . . 2,4 Mill.

Weißer Blutkörperchen . 9000
Färbeindex 0,83

27. XI. 25:

Hämoglobin 51 %
Rote Blutkörperchen . . 3,6 Mill.

Weißer Blutkörperchen . 5200
Färbeindex 0,71

12. IV. 26:

Hämoglobin 30 %
Rote Blutkörperchen . . 2,44 Mill.

Weißer Blutkörperchen . 8200
Färbeindex 0,62

Blutbild nach der Op. im Dez. 29:

Hämoglobin 70 %
Rote Blutkörperchen . . 5,36 Mill.
Weißer Blutkörperchen . 4800
Färbeindex 0,66

Mehrkernige neutrophile Leukocyten 69,7 %
Lymphocyten 22,8 %
Große mononukleäre Zellen } 6,7 %
Übergangsformen }
Eosinophile Zellen 0,8 %
Mastzellen —

Dez. 29: Gewicht 55 kg. Blutdruck 115. Senkungsreaktion: 4, 14,5, 65 (Leukocyten-schicht 2 mm). Keine Magenbeschwerden; jedoch starke Abneigung gegen Süßigkeiten. Operationsnarbe o. B.; kein Narbenbruch.

Fall 7: 48j. Mann. Typische Magenbeschwerden seit 12 J. Klin. Diagnose: Ulcus ventriculi simplex. Jan. 20 Magenresektion nach Billroth II. Patholog.-anatom. Diagnose: Ulcus ventriculi simplex. Beim Austritt geh.

Gewicht vor der Op. 50,5 kg.

Blutbild vor der Op.:

Hämoglobin 87 %
Rote Blutkörperchen . . 3,592 Mill.
Weißer Blutkörperchen . 5000
Färbeindex 1,22

Mehrkernige neutrophile Leukocyten 67 %
Lymphocyten 24,4 %
Große mononukleäre Zellen . 0,3 %
Übergangsformen 7,3 %
Eosinophile Zellen 0,3 %
Mastzellen 0,7 %

Blutbild nach der Op. im Nov. 29:

Hämoglobin 90 %
Rote Blutkörperchen . . 4,856 Mill.
Weißer Blutkörperchen . 6400
Färbeindex 0,93

Mehrkernige neutrophile Leukocyten 50 %
Lymphocyten 46 %
Große mononukleäre Zellen . 1,3 %
Eosinophile Zellen 2,4 %
Mastzellen 0,3 %
Blutplättchen im cmm: 242800.

Nov. 29: Gewicht 54,7 kg. Blutdruck 100. Senkungsreaktion: 2, 8, 54. Bei breiigen Speisen (Mais, Grieß, Reis) Druckgefühl im Magen; sonst keine Magenbeschwerden. Operationsnarbe: o. B.; kein Narbenbruch.

Fall 69: 25j. Mann. Typische Magenbeschwerden seit 2 J. Klin. Diagnose: Periduodenitis; Mesenteritis fibrosa; Neurasthenie. Juni 29 Magenresektion. Beim Austritt geh. Gewicht vor der Op. 60 kg.

Blutbild vor der Op.:

Hämoglobin 92 %
Rote Blutkörperchen . . 5,304 Mill.
Weißer Blutkörperchen . 9700
Färbeindex 0,85

Mehrkernige neutrophile Leukocyten 71 %
Lymphocyten 25 %
Große mononukleäre Zellen } 2,7 %
Übergangsformen }
Eosinophile Zellen 1,3 %
Mastzellen —

Blutbild nach der Op. im Dez. 29:

Hämoglobin	88 %
Rote Blutkörperchen . .	5,216 Mill.
Weißer Blutkörperchen .	6100
Färbeindex	0,85

Mehrkernige neutrophile Leukocyten	54,3 %
Lymphocyten	36 %
Große mononukleäre Zellen } Übergangsformen }	7 %
Eosinophile Zellen	2 %
Mastzellen	0,7 %

Dez. 29: Gewicht 54,4 kg. Senkungsreaktion: 2, 6, 65 (Leukocyten-schicht: 0,5 mm). Keine Magenbeschwerden. Klagt über Müdigkeit, Gewichtsabnahme, Stechen im Rücken; tagsüber öfters Schweißausbrüche. Operationsnarbe o. B.; kein Narbenbruch.

Fall 68: 39j. Mann. Typische Magenbeschwerden seit 6 J. Klin. Diagnose: Ulcus ventriculi. April 29 Magenresektion nach Finsterer. Beim Austritt geh. Gewicht vor der Op. 53,5 kg.

Blutbilder vor der Op.: 7. VI. 28:

Hämoglobin	90 %
Rote Blutkörperchen . .	4 Mill.
Weißer Blutkörperchen .	6700
Färbeindex	1,18

Mehrkernige neutrophile Leukocyten	64 %
Lymphocyten	30,6 %
Große mononukleäre Zellen } Übergangsformen }	3,8 %
Eosinophile Zellen	1,6 %
Mastzellen	—

10. IV. 29:

Hämoglobin	70 %
Rote Blutkörperchen . .	3,8 Mill.
Weißer Blutkörperchen .	5700
Färbeindex	0,92

Mehrkernige neutrophile Leukocyten	54 %
Lymphocyten	40 %
Große mononukleäre Zellen .	—
Übergangsformen	3 %
Eosinophile Zellen	1 %
Mastzellen	0,7 %
Plasmazellen	0,7 %

Blutbild nach der Op. im Dez. 29:

Hämoglobin	84 %
Rote Blutkörperchen . .	4,104 Mill.
Weißer Blutkörperchen .	4300
Färbeindex	1,92

Mehrkernige neutrophile Leukocyten	45,25 %
Lymphocyten	46,25 %
Große mononukleäre Zellen .	—
Übergangsformen	4,25 %
Eosinophile Zellen	4,25 %
Mastzellen	—

Dez. 29: Gewicht 60,9 kg. Blutdruck 90. Keine Magenbeschwerden bei Diät. Operationsnarbe o. B.; kein Narbenbruch.

Bei meinen Nachuntersuchungen wurden allerdings auch drei Anämiefälle festgestellt; jedoch stehen diese Anämien mit der Magenoperation in keinem Zusammenhang:

Fall 11: 43j. Frau. Typische Magenbeschwerden seit mehreren Jahren. Klin. Diagnose: Ulcus ventriculi. März 21 Magenresektion nach Billroth II mit G.E.

retrocolica post. Patholog.-anatom. Diagnose: Ulcera simplicia pylori; Gastritis chronica. Beim Austritt ohne Beschwerden. Gewicht vor der Op. 40 kg.

Blutbilder vor der Op.: März 21:

Hämoglobin 85%
Rote Blutkörperchen . . 4,744 Mill.

Weißer Blutkörperchen . 5600
Färbeindex 0,9

Blutbilder nach der Op.: 23. VI. 24:

Hämoglobin 34%
Rote Blutkörperchen . . 3,868 Mill.
Weißer Blutkörperchen . 3350
Färbeindex 0,44

Mehrkernige neutrophile Leukocyten 50 %
Lymphocyten 41,5%
Große mononukleäre Zellen . 1 %
Übergangsformen 2 %
Eosinophile Zellen 5 %
Mastzellen 0,5%

Jan. 30:

Hämoglobin 31%
Rote Blutkörperchen . . 3,828 Mill.
Weißer Blutkörperchen . 6600
Färbeindex 0,4%

Mehrkernige neutrophile Leukocyten 57%
Lymphocyten 25%
Große mononukleäre Zellen . } 16%
Übergangsformen }
Eosinophile Zellen 1%
Mastzellen 1%
Aniso- und Poikilocytose

Jan. 30: Gewicht 47,1 kg. Blutdruck 80. Senkungsreaktion: 13, 33, 130 (Leukocyten-schicht 1 mm). Keine Magenbeschwerden; jedoch auffallende Blässe der Haut und der Schleimhäute. Große Blutverluste bei den Menses: Prälimakterische Hypermenorrhoe. Operationsnarbe o. B.

Fall 24: 51j. Frau. Typische Magenbeschwerden seit 1 J. Klin. Diagnose: Ulcus ventriculi. März 23 Querresektion des Magens. Geh. Gewicht vor der Op. 48,6 kg.

Blutbild vor der Op.:

Hämoglobin 68%
Rote Blutkörperchen . . 3,632 Mill.
Weißer Blutkörperchen . 6520
Färbeindex 0,94

Mehrkernige neutrophile Leukocyten 74,33%
Lymphocyten 17,67%
Große mononukleäre Zellen . 1 %
Übergangsformen 3,33%
Eosinophile Zellen 2,34%
Mastzellen 1,33%
Leichte Poikilocytose

Blutbild nach der Op. im Dez. 29:

Hämoglobin 41%
Rote Blutkörperchen . . 3,616 Mill.
Weißer Blutkörperchen . 6200
Färbeindex 0,59

Mehrkernige neutrophile Leukocyten 65 %
Lymphocyten 26,3%
Große mononukleäre Zellen . 8 %
Übergangsformen 0,7%
Eosinophile Zellen —
Mastzellen —

Dez. 29: Gewicht 57,2 kg. Blutdruck 90. Senkungsreaktion: 9, 41, 117 (Leukocyten-schicht 1 mm). Keine Magenbeschwerden. Operationsnarbe o. B.; kein Narbenbruch. Jetzige Krankheit: Ausgedehntes Carcinom der Portio uteri.

Fall 21: 42j. Frau. Typische Magenbeschwerden seit 16 J. Klin. Diagnose: Ulcera ventriculi. Nov. 22 Magenresektion nach *Billroth II* mit G.E. retrocolica ant. Patholog.-anatom. Diagnose: Ulcus ventriculi subchronicum. Geh. Gewicht vor der Op. 37 kg.

Blutbild vor der Op.:

Hämoglobin	73%	Weißer Blutkörperchen . .	8840
Rote Blutkörperchen . .	4,016 Mill.	Färbeindex	0,91

Blutbild nach der Op. im Dez. 29:

Hämoglobin	51%	Mehrkernige neutrophile Leukocyten	72,4%
Rote Blutkörperchen . .	3,868 Mill.	Lymphocyten	19,5%
Weißer Blutkörperchen . .	6100	Große mononukleäre Zellen . .	3,9%
Färbeindex	0,67	Eosinophile Zellen	3,6%
		Mastzellen	0,6%

Dez. 29: Gewicht 36 kg. Blutdruck 75. Senkungsreaktion: 7, 27, 88 (Leukocyten-schicht 1,5 mm). Keine Magenbeschwerden bei Diät. Operationsnarbe o. B.; kein Narbenbruch. War vom Sept. bis Okt. 28 wegen Lungenhiluslymphknotentuberkulose in Langenbruck; hatte damals einen Herzfehler und deutlichen Hilusschatten der Lungen, subfebrile Temperaturen. Seither oft Schwächezustände.

Zur Veranschaulichung sind von *C. Henschen*¹ die Werte von Hämoglobin und Färbeindex vor und nach der Operation in 2 Kurven dargestellt.

Zusammenfassung.

77 nachuntersuchte Magenresektionsfälle. Bei 56 Fällen war das Blutbild vor der Operation bekannt; beim Rest können wir nur Angaben über den jetzigen Befund veröffentlichen.

1. Bei 62 der 77 Nachuntersuchten jetzt völlig normales Blutbild.
2. Bei den 17 Magenoperierten mit erhöhtem Färbeindex vor der Operation ist dieser nachher zur Norm herabgesunken.
3. Die 8, die vor der Operation niedrige Hämoglobinwerte zeigten (6 unter 60%, 2 unter 40% Hämoglobin), weisen bei der Nachuntersuchung normale Hämoglobinwerte auf.

4. Bei 14 (19,46%) findet sich jetzt relative Lymphocytose (Werte über 35% Lymphocyten). (Einer hatte schon vor der Operation relative Lymphocytose; bei 9 weißer Blutformel vor der Operation nicht bekannt.)

Von diesen 14 hat 1 im Jahre 1925 und 1926 (4 und 3 Jahre vor der Nachuntersuchung) eine Pneumonie durchgemacht; 1 leidet an Asthma; 2 haben geringe Magenbeschwerden; 1 ist auf Tuberkulose verdächtig. Die übrigen 7 boten in Anamnese und Befund nichts Besonderes.

Da sich relative Lymphocytose bei Neurasthenie, Vagotonie, „Basedow“ usw. finden kann, ist mit solchen Zuständen vielleicht ein Teil zu

¹ Arch. klin. Chir. 162, 631.

erklären. Auf jeden Fall wagen wir es nicht, die Lymphocytose als eine relativ häufig vorkommende Komplikation nach Magenoperationen anzusprechen.

5. Bei 3 (3,89%) besteht jetzt sichere sekundäre Anämie, nicht als Folge der Magenoperation, sondern stets durch eine weitere Krankheit erklärbar (präklimakterische Hypermenorrhöe; ausgedehntes Portiocarcinom des Uterus; Tuberkulose der Lungenhiluslymphknoten).

6. Bei keinem einzigen der Nachuntersuchten ergeben Blutbild und klinischer Untersuchungsbefund irgendwelchen Anhalt für perniziöse Anämie.

7. Allgemeinbefinden der meisten Nachuntersuchten außerordentlich gut.

8. 7 haben einen Narbenbruch. 2 von ihnen haben gegenwärtig noch geringe Magenbeschwerden, wie Druck in der Magengegend, Völlegefühl, selten Übelkeit. Die Beschwerden lassen sich durch den Narbenbruch gut erklären.

9. Bei 5, die über geringe Magenbeschwerden klagen, läßt sich nicht entscheiden, ob daran eine noch vorhandene organische Magenveränderung oder ob ein besonderer psychischer Zustand schuld ist.

10. Einige geben an, daß sie bei geeigneter Diät völlig beschwerdefrei seien, daß sie aber gewisse Speisen nicht ertragen könnten. Dieser Zustand, der ja auch bei gesunden Menschen nicht allzu selten ist, beeinträchtigt u. A. n. keineswegs irgendwie die guten Ergebnisse der Operation.

B. P. Babkin: Die äußere Sekretion der Verdauungsdrüsen, 2. Aufl. 1928. — *H. Denning*: Münch. med. Wschr. 1929, 633. — *Cl. F. Dixon, J. G. Bruns u. H. J. Giffni*: Zbl. Chir. 1926, Nr 6. — *R. Ehrström*: ebenda 1928, Nr 124. — *K. Faber u. A. Nyfeldt*: ebenda 1928, Nr 48. — *M. Faulhaber, v. Redwitz*: Z.org. Chir. 5, H. 10. — *Friedemann*: Zbl. Chir. 1929, Nr 38. — *G. Gordon, V. Hudson, E. W. Dodds, J. L. Warner u. L. E. H. Whitby*: Brit. J. Surg. 16, Nr 64 (1929). — *v. Haberer*: Zbl. Chir. 1929, Nr 38. — *C. Henschen*: Arch. klin. Chir. 162. — *Max Hochrein*: Münch. med. Wschr. 1929, 1317. — *Meulengracht*: Acta. med. scand. (Stockh.) 72, 231 (1929). — *Hartmann* (Rochester): Amer. J. med. Sci. 1921, Nr 593. — *Kirschner*: Zbl. Chir. 1929, Nr 14. — *A. Sidney Portis u. Bernard Portis*: Magenchemismus nach subtotaler Magenresektion. Orig.-Arb. — *H. Scheidel*: Med. Klin. 1930, Nr 7. — *Seyderhelm*: Zbl. Chir. 1922, 87. — *Gustav Stern*: Wien. klin. Wschr. 1929, 1560. — *H. Tillmann*: Lehrbuch der speziellen Chirurgie, 9. Aufl., 2. Teil. — *J. Zadeck*: Z.org. Chir. 320 (1927).

Meinem verehrten Lehrer, Hrn. Prof. C. Hensen, danke
ich für die Anregung zu diesem interessanten Thema
und für seine rege Anteilnahme am Verlaufe der Arbeit.

